

Anvillea garcinii subsp. *radiata*
(Coss. & Durieu) Anderb.



Basionyme : *Anvillea radiata* Coss. & Durieu (1856)

Synonymes : *Anvillea australis* L. Chevall. (1903)
Anvillea faurei Gand. (1913)
Sycodium radiatum (Coss. & Durieu) Pomel

Description : buisson bas, de moins de 60 centimètres de haut. **Tige** très rameuse dès la base, rigide, de couleur claire. **Feuilles** petites, triangulaires, au sommet atténué en un pétiole court de couleur vert glauque. **Fleurs** réunies en capitule à fleurs ligulées à la périphérie ; capitule grand, de 35 à 45 millimètres de diamètre, jaune orangé. **Bractées** coriaces.

Biogéographie : espèce saharo-sindienne à forte tendance méditerranéenne.

Type biomorphologique de Raunkier : chamaephyte.

Port : buisson très rameux, pouvant être plus large que haut.

Préférences édaphiques : espèce préférant les sols lourds pouvant être ensablés en surface.

Préférences hydriques : espèce xérophile et résistante à la sécheresse.

Tolérance aux sels : non.

Biotopes : individus isolés des pelouses xéro-mésophiles, se développant dans les épandages en marge des regs, en zone d'influence méditerranéenne plus ou moins marquée.

Intérêt pour le Criquet pèlerin : espèce pouvant servir d'abri.

Espèces voisines : ce taxon peut éventuellement être confondu avec *Asteriscus graveolens* (Forssk.) Less. subsp. *graveolens* ou *Perralderia coronopifolia* Coss.

Références bibliographiques

Ozenda	434	Quézel & Santa	949	Barry & Celles	56	Nègre	
--------	-----	----------------	-----	----------------	----	-------	--



Aspect général.



Feuilles, fleurs et infrutescence (capitule et bractées).

