

Atractylis aristata Batt.



Han

Description : espèce réputée vivace mais se comportant très souvent en annuelle. C'est une plante érigée assez rameuse, aux feuilles épineuses et raides. **Fleurs** jaunes réunies en capitules, **bractées** épineuses. **Fruits** : akènes velus munis d'une aigrette blanc sale très fournie.

Biogéographie : espèce saharo-sindienne.

Type biomorphologique de Raunkier : chamaephyte se comportant très souvent en thérophyte.

Port : plante herbeuse érigée, rameuse, épineuse, plutôt grêle. Sous l'effet traumatisant du pâturage, certains individus adoptent un port prostré, semi-érigé ou rampant.

Préférences édaphiques : sols limono-sableux, éventuellement rocailleux.

Préférences hydriques : espèce xérophile.

Tolérance aux sels : non.

Biotopes : épandages limono-sableux et rocailles ensablées de bas de pente.

Intérêt pour le Criquet pèlerin : espèce sans grand intérêt mais assez fréquente dans les biotopes de survie et de reproduction.

Espèces voisines : plusieurs taxons voisins sont présents, principalement en zone d'influence méditerranéenne mais ils sont nettement moins fréquents, comme par exemple *Atractylis serratuloides* Sieber ex Cass (espèce toujours prostrée).

Références bibliographiques

Ozenda	448	Quézel & Santa	1000	Barry & Celles	72	Nègre	
--------	-----	----------------	------	----------------	----	-------	--



Aspect général.



Fleur.



Fruits.

