

ASTERACEAE

Cotula cinerea Delile



Han

Synonymes : *Brocchia cinerea* (Delile) Vis. (1836)
Tanacetum cinereum (Delile) DC. (1837)

Description : plante de petite taille (10 à 15-20 centimètres de haut), annuelle, très odoriférante.

Feuilles et tiges couvertes de poils laineux qui confèrent à la plante une couleur cendrée (plus ou moins grisâtre). **Fleurs** réunies en capitules (8 à 10 millimètres de diamètre), denses, de couleur jaune plus ou moins intense ; pas de fleur ligulée.

Biogéographie : espèce saharo-sindienne, à préférences méditerranéennes.

Type biomorphologique de Raunkier : thérophyte poussant en saison fraîche.

Port : forme de petites touffes d'une quinzaine de centimètres de haut, pouvant atteindre plusieurs décimètres de diamètre.

Préférences édaphiques : espèce des sols sablo-limoneux.

Préférences hydriques : espèce xéroophile, voire mésophile.

Tolérance aux sels : non.

Biotoques : espèce des pelouses colonisant les regs sableux au Sahara sous influence climatique méditerranéenne. Souvent dominante, elle peut avoir de forts recouvrements.

Intérêt pour le Criquet pèlerin : représente un médiocre aliment mais peut constituer un abri pour les larves.

Espèce voisine : *Cotula anthemoides* L., de couleur verte plus ou moins foncée. Feuilles très découpées, capitules plus petits et munis de quelques fleurs ligulées (blanches).

Références bibliographiques

Ozenda	438	Quézel & Santa	988	Barry & Celles	55	Nègre	
--------	-----	----------------	-----	----------------	----	-------	--



Aspect général.



Cotula cinerea peut dominer et former des faciès paucispécifiques.

