

TOURNEUXIA Coss.

Capitulum multiflorum, homocarpum. Involuci polyphylli foliola subtri-
seriatim imbricata, dorso tomentosa margine membranaceo-scariosa. Recep-
taculum concaviusculum, epaleatum. Flosculi ligulati. Achaenia uniformia,
erostria, glabra, areola insertionis exacte basilaris, horizontaliter patentia,
obovato-cuneata, a dorso compressa, utrinque margine crassiusculo alata,
facie dorsoque ecostata. Pappus insertione obliqua ab apice faciei interioris
achænii rectangulatim ascendens, uniformis, multisets, setis pluriseriatis
dense plumoso-barbatis plumulis intertextis, nonnullis interioribus paulo
longioribus apice nudis, demum achænii faciei adpressis in planum orbicu-
lare expansis et circumcirca radiantibus. — Planta annua, subacaulis, plus
minus molliter tomentosa, Saharæ Algeriensis incola. Pedunculi nudi, elon-
gati, caudiculos brevissimos foliatos terminantes. Folia mire variabilia, in
eadem planta conformia vel polymorpha, nunc linearia vel oblongo-lanceolata
in petiolum sensim attenuata, nunc obovata vel suborbiculata in petiolum
abrupte contracta, integra vel grosse inæqualiterque dentata vel pinnatisida.
Capitula apice peduncularum solitaria, flosculis luteis sæpe infra purpura-
scentibus.

Genus hoc novum Cichoracearum, fabrica peculiari achæniorum et pappi
 inter omnes *Scorzonereas* insigne, cll. Aristidi Letourneux et Henrico Le-
 tourneux de la Perraudière, ambobus itineris nostri recentioris per Saharam
 Algeriensem australiorem strenuis devotisque sodalibus, amicitiae perpetuum
 pignus esse voluimus.

T. VARIIFOLIA Coss. ap. Kralik *Pl. Alger. select. exsicc.* [1858] n. 67 et
 67 bis.

Planta annua, subacaulis. Radix simplex, gracilis, descendens, caudiculos
 2-3 vel plures vel plurimos emittens. Caudiculi præsertim ad apicem foliati,
 brevissimi et sæpius arena mobili immersi et inde primo intuitu folia omnia
 radicalia videntur. Folia sæpius læte viridia, pubescenti-subtomentosa, in
 eadem planta conformia vel polymorpha, nunc linearia vel oblongo-lanceolata
 sensim in petiolum attenuata integra vel Plantaginis coronopifoliae more pinna-
 tisida, nunc obovata vel suborbiculata in petiolum elongatum abrupte contracta
 grosse et inæqualiter dentata rarius integra. Pedunculi aphylli, esquamati,
 debiles, sæpius 3-6 centim. longi, pubescenti-tomentosi, caudiculos et caudi-
 culorum ramulos terminantes, per anthesim erecti vel ascendentes, dein
 patentes capitulis sæpius in arena maturescentibus. Involucrum subcampanu-
 latum demum campanulato-subglobosum, foliolis dorso lanato-tomentosis,
 ligulis brevioribus, oblongo-lanceolatis, exterioribus apice sæpius arcuatis.
Achænia fuscescentia, ala marginali albida. Pappus primum candidus dein
sordide albidus. — Aprili-maio.

In Saharæ Algeriensis aggeribus arenæ mobilis necnon in alveis exsiccatis
 et depressis arenoso-glareosis. In provincia Cirtensi australiore ad *Chott Melrir!*
 et ad palmetum *El Hadjira!*; in provinciæ Algeriensis ditione *Mzab* haud
 infrequenter obvia a palmetis *Berrian!* et *Guerrara!* ad *Metlili!* et puteum
Hassi el Djual! prope palmetum *Ngoussa*.

