

Kebirita roudairei (Bonnet) Kramina & Sokoloff



Basionyme : *Lotus roudairei* Bonnet (1893)
Synonymes : *Acmispon roudairei* (Bonnet) Lassen
Lotus fruticulosus Coss.

Description : herbe vivace, semi-dressée à rampante, formant des touffes basses de 10 à 25 centimètres de haut, soyeuse à pubescente, grisâtre. **Tiges** raides. **Feuilles** un peu charnues, trifoliolées, glauques, paripennées, obovales, acuminées. **Fleurs** jaunes à étendard brun, très courtement pédonculées, ordinairement solitaires. **Fruits** : gousses cylindriques plus ou moins toruleuses, brunes et luisantes à maturité.

Biogéographie : espèce endémique ouest-saharienne.

Type biomorphologique de Raunkier : chamaephyte bas.

Port : plante vivace et pouvant se comporter en annuelle.

Préférences édaphiques : espèce psammophile et saxicole.

Préférences hydriques : espèce hyper-xérophile et résistante à la sécheresse.

Tolérance aux sels : non.

Biotopes : espèce poussant dans des rocailles ensablées.

Intérêt pour le Criquet pèlerin : peut éventuellement offrir abri et nourriture mais se développe ordinairement dans des biotopes de survie.

Références bibliographiques

Ozenda	296	Quézel & Santa	492	Barry & Celles	254	Nègre	
--------	-----	----------------	-----	----------------	-----	-------	--



Touffe dans un bas de pente rocailleux.



Rameau en floraison. Fleur passée virant au brun pourpre et jeune fruit.



Gousses lisses cylindriques, à peine toruleuses.

