

- Viscum latioribus & subrotundis foliis, flore purpureo.
Sloan. jam. 168. hist. 2. p. 92. t. 200. f. 2. Raj.
dendr. 52?
Habitat in Americæ arboribus. h.

4. LORANTHUS floribus aggregato-capitatis. Lonicarioides.
 Lonicera pedunculis multifloris, involucris pentaphyllis, foliis ovato-lanceolatis petiolatis. *Fl. zeyl. 83. **
Sp. pl. 1. p. 1. 175.
 Periclymenum surrectum, persicæ foliis, maderaspatanum. *Pluk. alm. 287. t. 212. f. 5.*
 Itti Canni. *Rheed. mal. 7. p. - t. 27.*
Habitat in Asiæ arboribus. h.
Flores huic sæpius pentandri.
5. LORANTHUS racemis trichotomis, pedunculis tri- Stelis.
 gonis, floribus æqualibus. *Læff. it. 187.*
Habitat in Cumanæ arboribus. h.

FRANKENIA.

1. FRANKENIA foliis linearibus basi ciliatis. lævis.
 Frankenia foliis confertis. *Roy. lugdb. 452.*
 Frankenia foliis aciformibus congestis. *Sauv. monsp. 46.*
 Franca floribus solitariis sessilibus, foliis prismaticis triangularibus. *Guett. stamp. 2. p. 459.*
 Franca maritima supina laxatilis glauca ericoides sempervirens, flore purpureo. *Mich. gen. 23. t. 22. f. 1.*
 Lychnis supina maritima, ericæ facie. *Raj. angl. 3. p. 38.*
 Anthyllis repens italica, thymi foliis, rubente flore, polygoni facie. *Till. pis. 46.*
 Cali f. Vermiculari marinæ non dissimilis planta. *Bauh. hist. 3. p. 703.*
 Polygonum fruticosum supinum ericoides cinereum, thymi folio, hispanicum. *Barr. ic. 714. Bocc. mus. 1. p. 7. t. 11.*
 Polygonum maritimum minus, foliis serpylli. *Bauh. pin. 281.*
Habitat in Europæ australis maritimis. 4.
2. FRANKENIA caulibus hirsutis, floribus fasciculatis hirsuta.
 terminalibus.
 Franca maritima supina multiflora candida, caulibus hirsutis, foliis quasi vermiculatis. *Mich. gen. 23. t. 22. f. 2.*

Polygonum creticum, thymi folio. *Baub. pin.* 281.
prodr. 131.

Alfene cretica maritima supina, caule hirsuto, foliis
quasi vermiculatis. *Tournef. cor.* 45.

Habitat in Apulia, Creta.

pulveru-
lenta,

3. **FRANKENIA** foliis obovatis retusis subtus pulve-
ratis.

Frankenia foliis ovalibus. *Sauv. monsp.* 168.

Franca maritima quadrifolia supina, chamæsyces folio
& facie. *Mich. gen.* 23.

Anthyllis valentina *Clas. hist.* 2. p. 186.

Anthyllis marina, chamæsyces similis. *Baub. pin.* 282.

Habitat in Susexiæ, Narbonæ, Italiæ, Apuliæ littoribus. ☉.

In ordine Naturali ad XL. referatur.

PEPLIS.

Portula.

1. **PEPLIS** floribus apetalis. *Fl. lapp.* 128. *Fl. suec.* 291,
312. *Hall. helv.* 406.

Glaucoides palustre, portulacæ folio, flore purpureo.
Mich. gen. 21. t. 18.

Glaux palustris, flore striato clauso, foliis portulacæ.
T. Petit. gen. 43. t. 43.

Glaux aquatica, folio subrotundo. *Læf. pruss.* 106.
t. 20.

Glaux altera, subrotundo folio. *Vaill. paris.* 80. t. 15.
f. 5.

Alfene palustris minor serpillifolia. *Baub. pin.* 251.

Habitat in Europæ inundatis. ☉.

petrandra.

2. **PEPLIS** floribus tetrandris monopetalis. *Jacq. amer.*
18. t. 180. f. 29. *Amæn. acad.* 5. p. 412. *

Amannia hirta, floribus parvis orbiculatis, floribus
singularibus ad alas. *Brown. jam.* 145.

Habitat in Jamaica. ☉.

DIGYNIA.

VELEZIA.

rigida.

1. **VELEZIA**. *Læf.*

Silene foliis subulatis cauli appressis, calycibus rigidis
intermedio longioribus *Sauv. monsp.* 145.

Lych-