

Maropsis deserti (de Noé) Pomel



Basionyme : *Sideritis deserti* de Noé (1857)

Lbas

Synonymes : *Ballota deserti* (de Noé) Jury, Rejdali & Griffiths (1998)
Marrubium deserti (de Noé) Coss. (1857)

Description : plante vivace sub-ligneuse, formant de petits buissons denses et blanchâtres en raison d'une abondante pilosité laineuse. Souvent mutilée pas les herbivores. **Feuilles** opposées en coin à la base et dentées-lobées au sommet. **Fleurs** petites, de couleur rose violacé, réunies en petits glomérules à l'aisselle des paires de feuilles ; le calice s'accroît considérablement lors de la fructification (calice accrescent) pour former une auréole membraneuse d'environ 1,2-1,5 centimètre autour du fruit.

Biogéographie : endémique nord-saharienne.

Type biomorphologique de Raunkier : chamaephyte.

Port : ligneux bas très rameux.

Préférences édaphiques : espèce psammophile et plus ou moins saxicole.

Préférences hydriques : espèce xérophile.

Tolérance aux sels : non.

Biotopes : espèce assez commune au Sahara septentrional et central, dans les oueds et les regs sableux.

Intérêt pour le Criquet pèlerin : susceptible de fournir abri et nourriture.

Références bibliographiques

Ozenda	402	Quézel & Santa	802	Barry & Celles	205	Nègre	
--------	-----	----------------	-----	----------------	-----	-------	--



Buisson bas rameux vert blanchâtre.



Petites fleurs labiées,
à peine plus longues que le calice, à la floraison.



Fructification, calices accrescents à maturité.

