Limeum obovatum Vicary



Synonyme : *Limonium indicum* Stocks ex T. Anderson (1860) Han

Le genre *Limeum* a été classé auparavant dans la famille des Molluginaceae.

Description : *L. obovatum* est une espèce de petite taille : de 10 à 20, voire 30 centimètres de diamètre. **Feuilles** opposées, petites, sub-orbiculaires (rondes), plus ou moins glutineuses. **Fleurs** verdâtres, petites, disposées en petits glomérules axillaires. **Fruits** petits et capsulaires.

Biogéographie : espèce du Sahara méridional. C'est le plus saharien des *Limeum* communs.

Type biomorphologique de Raunkier : thérophyte.

Port : espèce annuelle rampante et diffuse, plaquée au sol.

Préférences édaphiques : sols sableux et limoneux.

Préférences hydriques : espèce xérophile.

Tolérance aux sels : très faible.

Biotopes : sur le bas des pentes, les terrasses sableuses des oueds du Sahara méridional et dans des pelouses xérophiles très ouvertes.

Intérêt pour le Criquet pèlerin : faible. Se rencontre dans les biotopes de survie ou de reproduction.

Espèces voisines : ***Limeum viscosum*** (J. Gay) Fenzl var. *viscosum* est nettement plus grande, semi-érigée, possède des feuilles alternes arrondies, dont les nombreux poils glanduleux fixent le sable. C'est une espèce plus méridionale et psammophile que *L. obovatum*. Elle offre un meilleur abri et constitue une meilleure nourriture pour le Criquet pèlerin.

Limeum diffusum (J. Gay) Schinz possède des feuilles linéaires. Le port est diffus, semi-érigé.

Limeum pterocarpum (J. Gay) Heimerl **var. *pterocarpum*** est une espèce taxonomiquement voisine, avec des feuilles linéaires à port diffus et érigé. Elle est facilement reconnaissable à ses fruits ailés. Son développement est rapide et précoce.

Références bibliographiques

Ozenda	204	Quézel & Santa		Barry & Celles	276	Nègre	



Aspect général.



Espèce voisine : *Limeum viscosum*.



Espèce voisine : *Limeum pterocarpum*.

