ABUTILON FRUTICOSUM. Nob.

A. caule fruticoso lignoso, erecto, rigido, à basi ramoso; foliis petiolatis, cordatis aut lanceolatis, serratis quandoque integris, utrinque densè velutinis; pedunculis gracilibus, basi et apice articulatis unifloris; carpellis submuticis velutinis 3-spermis.

Caulis fruticosus, erectus rigidus, teres, pulverulentus, apice breviter tomentosus, à basi ramosus. — Folia petiolata, cordata, nunc ovalia acuta, nunc oblonga apice submutica sæpiùs breviter serrata, quandoque integra, circiter 1 $^1/_2$ poll. longa, $^1/_2$ poll. lata, utrinque densissimè et mollissimè velutina albida. — Stipulæ breves, filiformes, velutinæ, caducæ. — Flores axillares et terminales, flavescentes pedunculati; pedunculis longis, unifloris, gracilibus, basi et apice articulatis. — Calyx brevis, cyathiformis, 5-fidus; laciniis ovato-acutis, velutinis albidis. — Corolla 5-petala; petalis albo-flavescentibus, concavis, apice rotundis subundulatis. — Tubus stamineus conicus, brevis, rubellus, apice filamenta crebra approximata antherifera gerens; stigmatibus obtusis rubellis. — Carpella capsularia 10 calyce duplò longiora, stellatim disposita, submutica, densè tomentosa, unilocularia, bivalvia, 3-sperma. — Semina subreniformia, parva, fusca, subnuda.

Crescit in insulâ Saffal fluminis Senegal prope Saint-Louis.

Floret mensibus Septembre et Octobre.

OBSERVATIONS. Le nom spécifique que nous avons imposé à cette plante exprime bien sa nature ligneuse : mais il est important de ne pas confondre notre espèce avec le *Sida frutescens* de Cavanilles (*Diss.* 1, p. 19, t. 13, fig. 1); plante absolument différente, qui est un véritable *Sida*.