Grewia bicolor Juss. var. *bicolor*



Lhaut

Synonymes : *Grewia bicolor* Juss. (1804)
Grewia disticha Dinter & Burret (1910)
Grewia kwebensis N.E. Br. (1909)
Grewia miniata Mast. ex Hiern
Grewia heterophylla A. Rich. (1847)
Grewia cinerea A. Rich. (1847)
Grewia discolor Fresen. (1837)
Grewia pallida Hochst. ex A.Rich. (1847)
Grewia grisea N.E. Br. (1909)
Grewia mossambicensis Burret (1910)
Grewia madandensis J.R. Drumm. ex Baker f. (1911)

Description : arbuste buissonnant ou sarmenteux, ou petit arbre de 6- 8 mètres de haut. **Écorce** lisse, fissurée, de couleur grise. Jeunes rameaux tomenteux de couleur brun rougeâtre. **Feuilles** alternes, allongées, ovalo-oblongues (2-8 x 1-4 centimètres) et très nettement discolores : vert franc sur le dessus et vert blanchâtre sur le dessous (indumentum dense). **Fleurs** disposées en petits groupes axillaires à l'aisselle des feuilles, de couleur jaune (environ 1 centimètre de diamètre). **Fruits** d'environ 5 millimètres de diamètre, globuleux à 2 lobes.

Biogéographie : espèce paléo-tropicale des régions sèches.

Type biomorphologique de Raunkier : méso-phanérophyte.

Port : variable. Souvent arbustif ou buissonneux (plants mutilés), plus rarement sous la forme de petit arbre.

Préférences édaphiques : espèce eury-psammophile des sites rocailleux.

Préférences hydriques : espèce méso-xérophile.

Tolérance aux sels : non.

Biotopes : plante sahélienne que l'on retrouve dans les pentes rocailleuses et en bordure des mares en zone de transition Sahel/Sahara. Assez commune mais exceptionnellement abondante.

Intérêt pour le Criquet pèlerin : peu appréciée mais susceptible d'offrir abri et nourriture.

Espèce voisine : *Grewia bicolor* Juss. var. *bicolor* fait partie des *Grewia* à feuilles longues ordinairement munies de 3 nervures basales. Dans ce groupe, on retrouve ***Grewia flavescens*** Juss., à branches anguleuses et profondément cannelées, à feuilles à peine discolores (nervures parfaitement visibles sur la face inférieure), très nettement dentées sur les bords. Espèce sahélo-soudanienne.

Références bibliographiques

Ozenda	560	Quézel & Santa		Barry & Celles	338	Nègre	



Rameau dont une branche a été retournée pour montrer la face inférieure des feuilles de couleur vert blanchâtre.

