Glinus lotoides L. var. *lotoides*



Han

Synonymes : *Glinus dictamnoides* Burm. f.
Glinus lotoides L. (1753)
Glinus lotoides var. *dictamoides* (Burm.) Maire
Mollugo glinus A. Rich. (1847)
Mollugo hirta Thunb.
Pharnaceum hirtum Spreng.

Description : plante de décrue, à cycle tardif et relativement long. Facilement reconnaissable, densément velue. Forme des touffes plus ou moins denses de couleur gris bleuté, d'une vingtaine de centimètre de haut et d'un diamètre de quelques dizaines de centimètres. **Tige** robuste. **Feuilles** larges (2-3 centimètres), atténuées en coin sur le pétiole. **Fleurs** discrètes, de couleur blanchâtre, donnant un **fruit** capsulaire.

Biogéographie : espèce largement répandue en zone tropicale, présente au Sahara méridional à la faveur de biotopes favorables.

Type biomorphologique de Raunkier : thérophyte.

Port : herbe annuelle rampante et rameuse.

Préférences édaphiques : sols lourds, argileux et plus ou moins limoneux des dépressions inondables (mares temporaires).

Préférences hydriques : espèce tropophile, se développant lors du retrait des eaux.

Tolérance aux sels : faible.

Biotopes : plante caractéristique des sites d'accumulation temporaire des eaux.

Intérêt pour le Criquet pèlerin : peu d'intérêt. Le Criquet pèlerin peut, occasionnellement, l'utiliser pour s'abriter ou se nourrir dans des biotopes de survie.

Espèces voisines : ***Coldenia procumbens*** L. (Boraginaceae) et ***Chrozophora plicata*** (Vahl) A. Juss. ex Spreng. (Euphorbiaceae), plus tropicales mais ayant des tempéraments écologiques voisins.

Références bibliographiques

Ozenda	202	Quézel & Santa	311	Barry & Celles	277	Nègre	



Aspect général.



Feuilles et fruits.

