Mollugo cerviana (L.) Ser. ex DC. var. *cerviana*



Han

Basionyme : *Pharnaceum cerviana* L.

Synonyme : *Mollugo cerviana* (L.) Ser. ex DC. (1824)

Description : petite plante glabre, très grêle, diffuse et de petite taille : de 10 à 15, voire 20 centimètres de haut. **Feuilles** linéaires, étroites, verticillées aux entre-nœuds, tige orangée. **Fleurs** petites, blanches, inflorescence en cyme. **Fruits** en capsules.

Biogéographie : espèce pantropicale et des régions chaudes.

Type biomorphologique de Raunkier : thérophyte. Ce taxon peut se comporter en éphémèrophyte.

Port : herbe annuelle érigée.

Préférences édaphiques : espèce psammophile.

Préférences hydriques : espèce xérophile, de début de saison des pluies.

Tolérance aux sels : non.

Biotopes : espèce poussant dans les sables très légèrement limoneux après les pluies en zone saharo-sahélienne et qui remonte au Sahara à la faveur des oueds sableux.

Intérêt pour le Criquet pèlerin : espèce délaissée.

Espèce voisine : ***Mollugo nudicaulis*** Lam., dont les feuilles sont réunies en une rosette basale de 4 à 10 centimètres de diamètre. L'inflorescence est une cyme trichotome (à trois brins) dont un rameau reste stérile. C'est une espèce plus tropicale qui préfère les sols sablo-limoneux et dont les feuilles peuvent être consommées par le Criquet pèlerin. Peut être localement abondante.

Références bibliographiques

Ozenda	202	Quézel & Santa	308	Barry & Celles	277	Nègre	



Aspect général.



Espèce voisine : *Mollugo nudicaulis*, en fleurs.



Espèce voisine : *Mollugo nudicaulis*, plante âgée en fructification.

