Nitraria retusa (Forssk.) Asch.

Basionyme : *Peganum retusum* Forssk. (1775)

Synonymes : *Nitraria sericea* Jaub. & Spach
Nitraria tridentata Desf. (1798)

Lbas

Dans certaines flores, ***Nitraria retusa*** a été reclassée dans la famille des Nitrariaceae mais les données récentes la réintègrent dans sa famille d'origine, les Zygophyllaceae.

Description : buisson épineux et sarmenteux, moyen à haut, pouvant atteindre 1,80 mètre. Jeunes **rameaux** pointus se transformant en épines. **Feuilles** sub-charnues, triangulaires, à sommet parfois denté (3-5 dents) au sommet. **Fleurs** moyennes (environ 15 millimètres), de couleur blanche plus ou moins verdâtre ou jaunâtre. **Fruits** : drupes pyramidales coniques de 1 à 1,5 centimètre de long, rouges à maturité.

Biogéographie : espèce saharo-sindienne à affinités méditerranéennes.

Type biomorphologique de Raunkier : nano-phanérophyte.

Port : ligneux bas plus ou moins épineux (par les rameaux).

Préférences édaphiques : espèce eury-psammophile.

Préférences hydriques : espèce (xéro-)mésophile.

Tolérance aux sels : espèce halo-gypsophile.

Biotopes : plante des sables plus ou moins salés ou gypseux, que l'on rencontre sur le littoral ou en bordure de sebkha.

Intérêt pour le Criquet pèlerin : peut servir d'abri mais peu consommée.

Références bibliographiques

Ozenda	322	Quézel & Santa	591	Barry & Celles	352	Nègre	



Rameau feuillé portant de courts rameaux latéraux épineux.

Détail d'un rameau.



Feuilles sub-charnues, en coin et faiblement dentées à l'apex.



Fleurs et fruits.



Feuilles réunies en petites cymes latérales.

