Boerhavia repens L.



Han

Synonymes : *Boerhavia diffusa* auct.
Boerhavia diffusa var. *minor* (Delile) Cufod.
Boerhavia plumbaginea auct.
Boerhavia repens var. *glabra* Choisy
Boerhavia repens var. *minor* Delile
Boerhavia repens L. subsp. *repens*
Boerhavia repens var. *mollis* Batt. & Trab. (1907)
Boerhavia repens var. *undulata* (Ehrenb.) Asch. & Schweinf.
Boerhavia vulvariifolia Poir.
Boerhavia undulata Ehrenb.

Autant il est facile de reconnaître un *Boerhavia*, autant il est délicat d'en distinguer les espèces et leurs différentes formes. En zone saharienne, une espèce prédomine amplement : *B. repens*.

Description : herbe très polymorphe formant de grandes touffes rampantes, jusqu'à 150 centimètres de diamètre et 15-20 centimètres de haut. **Fleurs** petites, roses ou blanches, regroupées en cymes axillaires plus ou moins lâches ou contractées. **Fruit** petit et obconique (environ 3 millimètres de long).

Biogéographie : espèce pantropicale.

Type biomorphologique de Raunkier : thérophyte, voire hémicryptophyte.

Port : plante herbeuse, le plus souvent annuelle mais pouvant devenir pluriannuelle, grâce à une souche ligneuse.

Préférences édaphiques : espèce eury-psammophile.

Préférences hydriques : espèce eury-xérophile.

Tolérance aux sels : tolère une faible salinité.

Biotopes : espèce fréquente et assez souvent abondante, colonisant de nombreux milieux à condition qu'ils ne soient pas extrêmes. Fréquente sur les sols alluviaux, supporte les submersions de courte durée.

Intérêt pour le Criquet pèlerin : PLANTE IMPORTANTE. Appréciée, elle peut fournir abri (aux larves) et servir de nourriture.

Espèce voisine : *Commicarpus verticillatus* (Poir.) Standl., plante sub-ligneuse formant de petits buissons (chamaephyte). Espèce saxicole du Sahara central et méridional.

Références bibliographiques

Ozenda	218	Quézel & Santa	307	Barry & Celles	284	Nègre	



Fragment de touffe, tige rampante.



Tiges, feuilles et fruits.

