


2314. **Linaria Monodiana** Maire, n. sp. (subgen. *Elatinoides*). — Annua ut videtur, caulibus prostratis elongatis, ramosis, pilis articulatis crispulis usque ad 2 mm longis, *parum inaequalibus*, *molliter* villosis, *vix nevix glandulosis*. Folia parva (usque ad 8 × 9 mm), triangulari-ovata acuta mucronata, basi truncata auriculis 2 ovatis patulis plus minusve mucronatis praedita, utrinque laxe villosa villis articulatis flexuosis usque ad 0,8 mm longis, eglandulosa, margine saepius fere glabra, omnia praeter infima breviter petiolata petiolo longe villoso limbo valde breviore (vix usque ad 2 mm longo) ; folia inferiora exauriculata, basi rotundata utrinque 2-3-dentata ; folia infima integra obovata basi in petiolum longiusculum adtenuata. Flores solitarii axillares pedunculo plus minusve patulo, apice reflexo, folio fulcrante valde longiore (usque ad 15 mm longo), basi longe villoso, medio glabro l. glabrescente, *superne breviter glanduloso-piloso* suffulti. Calycis laxiuscule et breviter *glanduloso-pilosi, haud villosi* laciniae lineari-lanceolatae apice longe acuminatae, *margine inferne anguste albo-scariosae*, corollae tubum c. aequantes. Corolla extus laxe et breviter glanduloso-pilosa, *amoene bicolor*, labio superiore fere usque ad basim bifido *vivide violaceo; inferiore flavo ;* palato albido-villoso plus minusve atroviolaceo punctato ; tubo et calcari flavidis violaceo suffusis et venosis ; calcari recto acutiusculo reliquam corollam subaequante, c. 6 mm longo. Semina (haud perfecte matura) *grosse tuberculata* tuberculis hyalinis interdum plus minusve confluentibus. Capsula breviter et laxissime glanduloso-puberula, calyce parum brevior.

Ab affinibus *L. Elatine* (L.) Desf., *L. commutata* Bernh., *L. cirrhosa* (L.) Willd. eximie recedit: a priore indumento caulino simplici eglanduloso, calyce glanduloso-piloso nec villoso, seminibus tuberculatis ; a secundo indumento caulino et calycino simplici, corollae coloribus, calcari recto ; ab ultima caulibus et pedunculis haud filiformibus, foliis latis brevibus, caule magis viscoso, calycis laciniis lineari-lanceolatis anguste scarioso-marginatis.

Sahara occidental : entre Tagoujalet et le Hank, janvier 1935 (Monod nos 5218 et bis et ter).

2314. Linaria Monodiana Maire, n. sp. (sous-genre Elatinoides). Plante annuelle, à tiges prostrées et allongées, ramifiées, couvertes de poils rêches, légèrement inégaux et légèrement villeux, à peine glanduleux. Feuilles petites (jusqu'à 8 x 9 mm), triangulaires-ovales, aiguës, mucronées, tronquées à la base, présentant deux oreillettes ovales, larges et plus ou moins mucronées, lâchement villeuses avec des villosités articulées et flexueuses sur les deux faces, mesurant jusqu'à 0,8 mm de long, non glanduleuses, à marge souvent presque glabre. Toutes, sauf la plus basse, sont brièvement pétiolées, avec un long pétiole villeux et un limbe très court (à peine 2 mm de long). Les feuilles inférieures sont auriculées, arrondies à la base et 2 à 3-dentées sur les deux faces. Les feuilles les plus basses sont entières, obovales à la base, s'atténuent en un pétiole plus long. Fleurs solitaires axillaires à pédoncule plus ou moins étalé, réfléchi à l'apex, feuille fulcrum très longue (jusqu'à 15 mm de long), base longuement villeuse, partie médiane glabre, supportée dans sa partie supérieure brièvement glanduleuse-pileuse. Calice lâchement et brièvement glanduleux-pileux, non villeux, lacinies linéaires-lancéolées, longuement acuminées à l'apex, étroitement scarieuses blanches sur le bord inférieur, corolles égales aux tubes. Corolle extérieurement lâchement et brièvement glanduleuse-pileuse, agréablement bicolore, lèvre supérieure presque jusqu'à la base bifide violet vif ; lèvre inférieure jaune ; palais blanchâtre-villeux plus ou moins ponctué de violet foncé ; tube et calice teintés et veinés de violet jaunâtre ; calice droit, plus aigu et subégal au reste de la corolle, d'environ 6 mm de long. Graines (imparfaitement mûres) grossièrement tuberculées de tubercules hyalins parfois plus ou moins confluents. Capsule courte et très lâchement glanduleuse-pubescente, calice légèrement plus court.
Se distingue exceptionnellement des espèces apparentées *L. elatine* (L.) Desf., *L. commutata* Bernh. et *L. cirrhosa* (L.) Willd. : de la première, enveloppe cauliforme simple, calices glanduleux-pileux mais non villeux, graines tuberculées ; de la seconde, enveloppe et calice cauliformes simples, corolles colorées, calcar droit ; de la dernière, cauliformes et pédoncules non filiformes, feuilles courtes et larges, tige plus visqueuse, calices linéaires-lancéolés à marges étroitement scarieuses.
Sahara occidental : entre Tagoujalet et Hank, janvier 1935 (Monod n° 5218 et deux et trois).