Plantago ciliata Desf.



Han

Description : herbe formant de petites touffes très velues et denses (moins de 12 centimètres de haut). **Tige** très courte, dressée. **Feuilles** en lancette (spatulée-lancéolée), couvertes de longs poils leur donnant une couleur vert grisâtre. **Épis** plus ou moins globuleux ou oblongs, disposés au sommet de tiges à peine plus longues que les feuilles, velus, ayant un aspect hirsute. Bractées et corolles ciliées.

Biogéographie : espèce saharo-sindienne à préférences méditerranéennes.

Type biomorphologique de Raunkier : thérophyte.

Port : herbe annuelle basse.

Préférences édaphiques : espèce des sols sablo-limoneux et plus ou moins rocailleux.

Préférences hydriques : espèce méso-xérophile.

Tolérance aux sels : non.

Biotopes : espèce fréquente dans les oueds, les bas de pente et les dépressions de regs plus ou moins sableux, en zone saharienne septentrionale et centrale.

Intérêt pour le Criquet pèlerin : offre peu de possibilité d'abri mais peut être consommée. Présente dans les biotopes de survie ou de reproduction.

Espèce voisine : ***Plantago albicans*** L. se distingue par des tiges très courtes et des épis allongés beaucoup plus longs que larges. Feuilles poilues, soyeuses, corolles glabres. Plante assez polymorphe du Sahara septentrional.

Références bibliographiques

Ozenda	409	Quézel & Santa	864	Barry & Celles	295	Nègre	



Individus en pleine feuillaison et floraison. Petite touffe d'une douzaine de centimètres de haut.



Touffe claire montrant la forme caractéristique des feuilles.



Feuilles couvertes de longs poils blancs.



Fleurs. Corolles et bractées ciliées.



Touffe en fin de cycle : fructification et début de dessèchement.

