GLOBULARIACÉES

Inflorescences réunies en capitules denses. Fleurs 5 mères zygomorphes. Calice à 2 lèvres inégales à lobes linéaires lancéolés (fig. 2568).

Globularia (Globulaire) « *Chebra* » « *Zerga* »

Arbustes à tiges érigées. Feuilles sans stipules ± cunéiformes spatulées très entières, alternes ou fasciculées. Péricline à écailles nombreuses. Corolle bleue violacée (RR blanche) à lèvre supérieure très courte. 4 étamines. Ovaire uniloculaire uniovulé — Rocailles, garrigues — | *Méd.* |.

2568. — **G. Alypum** L.

a) Capitules en général à la fois terminaux et latéraux, larges de 15 mm. Ecailles du réceptacle et calices faiblement velus — CC : dans toute l'Algérie.
ssp. **eu-Alypum** L.

— Capitules en général terminaux au sommet de tiges dressées à feuilles progressivement réduites, larges de 20 mm. Ecailles du réceptacle et calices très hispides, laineux blanchâtres — C : AS, SS, SC, : Hoggar et Tassili en montagne — | *Méd.* | — (= *G. vesceritensis* Batt. et *G. eriocephala* Pomel).
ssp. **arabica** (Jaub. et Spach) Maire

ACANTHACÉES

Famille voisine des Scrofulariacées dont elle diffère surtout par les caractères de la graine.

Acanthus (Acanthe) « *Bakhbakh* » « *Cabounia* »

Plantes vivaces herbacées, à grandes feuilles ± découpées lobées. Inflorescences en longs épis terminaux robustes, hauts de 40-80 cm. Calice subbilabié à 4 divisions ± égales. Corolle blanchâtre veinée de violet, tube très court, à lèvre supérieure absente, l'inférieure grande, trilobée. 4 étamines. Capsule ovoïde à 2 loges, à 1-2 graines.

1 Feuilles à lobes terminés en épine, à lobes profonds atteignant presque le rachis. Fleurs pourvues d'une grande bractée épineuse et de 2 bractéoles linéaires lancéolées, épineuses au sommet — Broussailles, ravins — RR : A1 — | *E Méd.* |.

2569. — **A. spinosus** L.