2090. **Limoniastrum Weygandiorum** Maire et Wilczek, Bull. Soc. Hist. Nat. Afr. Nord, 26, p. 129, mai 1935 (subgen. *Bubania*) — Suffruticosum, caespites saepius magnos subhemisphaericos efformans; radix lignosa palaris; caudex crassus lignosus multiceps; caules breves lignosi vestigiis foliorum fuscis vestiti. Folia rosulata, coriaceo-crassiuscula, incrustatione calcarea undique cano-lepidota, caeterum glabra, *limbo late obovato* apice ogivali, rotundato l. retuso, mucronato mucrone facile


deciduo, basi sensim l. abruptiuscule in petiolum limbo breviorem, rarius aequalem l. vix longiorem, adtenuata, integra. Scapus e centro rosulae enatus, brevis, cano-lepidotus et praeterea pilis glandulosis crassis hyalinis sparsis praeditus, *parte indivisa foliis plerumque breviore*, interdum aequali. Inflorescentia cymosa folia parum superans, lata, intricata, conferta, fragilis. Bracteae rufo-brunneae ovatae, l. e basi ovata lanceolatae, semi-amplexicaules auriculis laciniatis laciniis subulatis subpungentibus, plurinerviae, apice in apiculum subpungentem abeuntes, *pubescentes*. Rami inflorescentiae sicut scapus cano-lepidoti et glanduloso-pilosi. Spiculae 1-florae; bractea externa scariosa rufo-brunnea, multifida, pubescens; media nulla; interna convoluta valde indurata, breviter et patule villosa simul ac cano-lepidota, spinis longis recurvis patule villosis undique horrida, 9-10 mm longa. Calyx scariosus, apice truncatus erosus, glaberrimus. Corolla c. 12 mm longa, purpurea, fere usque ad medium 5-fida, laciniis obovatis, glabra. Filamenta basi pilosa in fauce inserta. Styli usque ad 1/2 coaliti.

Hab. in arenosis ad litus Oceani prope ostium amnis Aourioura, aprili florens.

Haec tertia species subgeneris *Bubaniae* a duabus prioribus eximie recedit. A *L. Feei* (De Girard) Batt. differt foliis late obovatis; scapis folia haud excedentibus; inflorescentia folia parum superante; spiculae bractea interna cano-lepidota. A *L. migiurtino* (Chiovenda) Maire, comb. nov. (= *Bubania migiurtina* Chiovenda Flora Somala, 1, p. 212), cui foliis latis accedit, valde differt scapo brevi (nec elongato, usque ad 0,60 m alto), folia haud superante; inflorescentia densa ramosissima lata brevi (nec laxissima, parum ramosa, elongata); stylis usque ad 1/2 (nec basi tantum) coalitis; calyce apice truncato (nec in lobos lanceolatos acutissimos diviso); etc.

Hanc plantam incoli arabice vocant « ouden el hallouf », id est « auris suis », ob folii formam.

Nous sommes heureux de dédier cette belle plante au général Weygand, ancien généralissime de l'armée française, et à son fils, le capitaine Weygand, avec lequel nous avons trouvé cette belle nouveauté.



Boüan, Imp.

Limoniastrum Weygandiorum Maire et Wilczek (N° 2090)