3016. **Limonium chrysopotamicum** Maire, n. sp. — Perenne, radice crassa palari, a basi ramosum, caulibus erectis l. erecto-patulis ramosissimis ramis intricatis ; folia omnia basalia rosulata, obovata, basi in petiolum limbo longiorem l. breviorem adtenuata, apice rotundata l. subemarginata, mucronata, glaucescentia, margine angustissime calloso integra l. plus minusve eroso-denticulata, plus minusve calcareo-incrustata, glabra, laevia. Caules et rami glaucescentes, *nudi, undique tuberculis elevatis irregularibus apice impressis et papillatis exasperati*, plus minusve calcareo-incrustati, bracteiferi, plus minusve angulati, semiteretes l. obsolete triquetri. Rami inferiores steriles breves, acuti, *vix rigidi, haud pungentes*. Bracteae ovato-lanceolatae, scariosae, rufo-fuscae albido-marginatae, apice acutae mucronatae, usque ad 3 ^{mm} longae. Rami superiores fertiles in cincinnos breves (usque ad 8 ^{mm} longos) producti, inflorescentiam dense corymboso-paniculatam efformantes. Spiculae 3-4-florae 2-bracteatae ; bractea externa c. 1,5 ^{mm} longa, ovato-rotundata, subcoriacea, fusco-rubra margine albido-scarioso-marginata, dorso subcarinata longiuscule villosa villis rigidis subadpressis, apice rotundata, basi plus minusve amplexicaulis ; bractea superior duplo longior, late obovato-rhomboidea, dorso plus minusve carinata, herbacea viridis, longe villosa villis erecto-patulis, late albido-scarioso-marginata, apice rotundata, basi adtenuata. Bracteolae albido-scariosae, tubo calycino breviores. Calycis tubus purpureus, praecipue inter costas longe villosus villis erecto-patulis ; limbus pulchre roseus, inter nervos breviter adpresse pubescens, superne glaber plus minusve lobatus lobis obtusis haud aristatis plus minusve undulato-crenatis. Corolla purpureo-violacea calycem haud excedens, demum corculata. Capsula operculo dehiscens ; semen oblongo-fusiforme laeve. Planta usque ad 20 cm alta ; calyx 4 ^{mm} longus.

Ab affini *L. Brunneri* (Webb) O. K. recedit scaporum articulis semiteretibus l. obsolete triquetris (nec eximie triquetris costis acutis interdum subalatis) ; ramis sterilibus tenuioribus haud rigidis pungentibus; ramis omnibus tuberculis elevatis valde asperioribus ; calycis limbi nervis glabris ; bracteis longius villosis. Ab affini quoque *L. papillato* (Webb) O. K. differt tuberculis laxioribus irregularibus ; scapis haud flexuosis articulis haud complanatis, spiculis 3-4- (nec 4-6-) floris ; bractea inferiore villosa, superiore latiore ; calyce longius villoso.

Rio de Oro : Anouti (Murat, n° 2527) ; de Touf à Tagerzimt (M., n° 2575) ; Dora au S du Cap Juby (M., n° 2469).

Nom indigène : hatchan.