180. **A. brevisubulata** Maire in M. C. 3382 *quater* (1941). — *A. longiflora* Schum. var. *brevisubulata* Maire in M. C. 2600 (1938). — ♃ ou ①.

Lâchement et faiblement cespiteux, à innovations rares ; plante entièrement glauque, souvent ± lavée de violacé, devenant jaune paille en se desséchant, pouvant atteindre 60 cm de haut. Chaumes dressés ou ascendants, rameux à tous ou presque tous leurs nœuds ; rameaux fasciculés, rarement solitaires ; nœuds renflés, violet noir, glabres ; entrenœuds glabres, à peine striés, cylindriques, grêles (c. 1 mm diam.), la plupart scabres. Gaines presque toutes très dilatées à la base, rétrécies et cylindriques au-dessus, striées, glabres et lisses (sauf les inférieures qui sont parfois un peu scabres ou brièvement hérissées sur le dos), presque toutes < entrenœuds, à marges hyalines, à oreillettes très courtes brièvement et densément ciliées ; ligule très réduite, très brièvement ciliée ; limbes 3-20 cm × 1-2 mm (lorsqu'ils sont étalés), convolutés depuis la base, dressés, glabres, striés et lisses (ou un peu scabres à la base) extérieurement, scabres intérieurement, aigus non piquants. Panicules très nombreuses, terminales sur les rameaux, racémiformes, étroites, lâches, à axe glabre mais scabre, à rameaux géminés ou ternés portant 1-2 épillets, scabres. Epillets > pédoncules, verdâtres ou ± lavés de violet, glabres. Glumes 1-nerviées, très inégales ; l'inférieure lancéolée, aiguë, mucronée, à carène scabre, c. 10 mm ; la supérieure plus étroite, arrondie sur le dos, lisse, c. 20 mm, bifide à lobes aigus de 2 mm, avec un mucron de 1 mm dans le sinus. Lemme enroulée cylindrique, 3-nerviée, lisse, c. 6 mm, avec un callus aigu densément et brièvement velu, c. 2 mm ; colonne de l'arête 12-25 mm, très lâchement tordue, scabre ; branches de l'arête subégales, scabres, 5-5,5 cm. Paléole brunâtre, 2-nerviée, oblongue, c. 1,5 mm. Lodicules 2, ovales, plurinerviées, brunes, dentées et ± ciliolées au sommet, c. 2 mm. Anthères 3, jaunes, c. 3 mm. Caryopse cylindrique, c. 4 × 0,4 mm, brunâtre, à macule hilaire linéaire occupant toute sa longueur ; embryon c. 1 mm. Floraison : après les pluies.



FIG. 238. — *Aristida brevisubulata.*

Rocailles désertiques. Plante du Sahara méridional occidental atteignant nos limites dans le Tasiast ! (MURAT nº 1972).

Aire géographique. — Adrar de Mauritanie.