Dactyloctenium aegyptium (L.) Willd.



Han

Basionyme : *Cynosurus aegyptius* L. (1753)

Synonymes : *Chloris guineensis* Schumach. (1827)
Eleusine aegyptia Desf. (1798)
Eleusine cruciata Lam. (1791)
Rabdochloa mucronata (Michx.) P. Beauv. (1812)

Dactyloctenium aegyptium est une Eragrostidae.

Description : herbe annuelle, exceptionnellement pluriannuelle, formant des touffes lâches émettant des stolons, haute de 30 à 50 centimètres. **Feuilles** larges avec des marges ciliées (poils tuberculés). **Inflorescences** robustes digitées, composées de 3 à 6 racèmes de moins de 6 centimètres de long, terminés par une pointe rigide.

Biogéographie : espèce des régions chaudes du Vieux Monde. Elle a été introduite en Amérique (adventice des cultures).

Type biomorphologique de Raunkier : thérophyte susceptible de passer la mauvaise saison si les conditions hydriques sont favorables.

Port : herbe annuelle.

Préférences édaphiques : espèce eury-psammophile.

Préférences hydriques : espèce xéro-mésophile.

Tolérance aux sels : non.

Biotopes : plante très commune en zone sahélienne, *lato sensu*. Plus ou moins rudérale, elle affectionne les sables humides des interdunes ou les lits d'oued.

Intérêt pour le Criquet pèlerin : espèce présentant un intérêt restreint. Elle peut offrir un abri médiocre et éventuellement une nourriture moyennement appréciée.

Références bibliographiques

Ozenda	174	Quézel & Santa	112	Barry & Celles	417	Nègre	



Groupement sahélien où l'on reconnaît facilement ***Dactyloctenium aegyptium*** à ses inflorescences digitées regroupant des racèmes trapus et de couleur claire.



Détail de l'inflorescence digitée constituée de 3 racèmes.



Inflorescence. (Cliché : Pierre Poilecot, Cirad)

