Enneapogon desvauxii P. Beauv.



Hviv

Synonymes : *Enneapogon brachystachyus* (Jaub. & Spach) Stapf (1900)
Enneapogon pusillus Rendle (1899)
Pappophorum pusillum (Rendle) K. Schum. (1901)
Pappophorum vincentinum J.A. Schmidt (1852)

Le genre *Enneapogon* appartient à la tribu de Pappophoreae.

Description : herbe vivace, formant ordinairement de petites touffes de moins de 10 centimètres de diamètre et de 5 à 30 centimètres de haut. L'**inflorescence** est une panicule spiciforme (2 à 8 centimètres de long). Les **lemmes** sont munies de 9 arêtes terminales ciliées.

Biogéographie : espèce saharo-sindienne d'affinités tropicales. Également présente en Amérique latine.

Type biomorphologique de Raunkier : hémicryptophyte pouvant se comporter en thérophyte.

Port : herbe pluriannuelle, pouvant être annuelle.

Préférences édaphiques : espèce eury-psammophile des sites rocailleux.

Préférences hydriques : espèce xérophile, voire hyper-xérophile.

Tolérance aux sels : non.

Biotopes : espèce fréquente dans les rocailles : bas de pente, ravines, lits d'oued, regs… où elle peut être localement abondante.

Intérêt pour le Criquet pèlerin : espèce n'offrant qu'un abri médiocre mais pouvant néanmoins être consommée.

Espèce voisine : ***Enneapogon scaber*** Lehm. est une espèce fort similaire, morphologiquement et écologiquement, qui se distingue par des lemmes munies d'arêtes non plumeuses et plus ou moins scabres.

Références bibliographiques

Ozenda	178	Quézel & Santa	113	Barry & Celles	421	Nègre	



Touffe en voie de dessèchement.



Port de la plante. (Cliché : Pierre Poilecot, Cirad)



Inflorescence.
(Cliché : Pierre Poilecot, Cirad)

