Eragrostis Host

Panicule généralement diffuse, rarement contractée. Epillets indépendants, à deux ou plusieurs fleurs fertiles; pédonculés, comprimés latéralement, à fleurs légèrement imbriquées. Glumes plus courtes que les fleurs.

1	Plantes vivaces	2
—	Plantes annuelles	4

2 Plante atteignant 1 m. Chaumes dressés, robustes. Panicule à rameaux inférieurs géminés ou ternés, les supérieurs solitaires. Epillets vert-noir. Caryopse oblong. Panicule à rameaux ± étalés. Epillets de 5-7 mm. Feuilles généralement un peu poilues à la base du limbe — Pâturages sablonneux humides — RR : K3 : La Calle — var. **Fontanesiana** M. — | *Paléo et néotrop.* |.

204. — **E. atrovirens** (Desf.) Trin.

— Plantes n'atteignant pas 50 cm, à chaumes le plus souvent couchés ou ascendants 3

3 Panicule à rameaux inférieurs verticillés par 4-5, les supérieurs ternés, géminés ou solitaires. Chaumes florifères longuement velus sous la panicule. Epillets vert-noir, de 2-4 mm. Caryopse oblong, pointu à la base et arrondi au sommet — Dayas, terrains sablonneux sublittoraux — K3 : La Calle, Senhadja — | *E. Afr.* |.

205. — **E. trichophora** Coss. et Dur.

— Panicule à rameaux solitaires ou géminés. Chaumes florifères glabres. Epillets ± violacés, de 3-7 mm. Caryopse ovoïde — Plante des lieux arides : rochers, rocailles, pâturages pierreux et sablonneux — AC : H2, AS1-2-3. RR, SS : sommets du Hoggar — | *Ibéro-Maur.* |.

206. — **E. papposa** (Duf.) Steud.

4 Marge foliaire scabre, ciliée et portant des tubercules glanduliformes espacés. Panicule à rameaux solitaires. Glumes peu inégales (1,8-2 mm), ovales. Epillets verdâtres et lavés ou non de violet. Caryopse ovoïde-subglobuleux — Champs, pâturages, sables humides — | *Paléo et néotrop.* | — (= *E. multiflora* Asch., *E. megastachya* Link).

207. — **E. cilianensis** (All.) Vign.
Lutati

a) Gaines glabres — Du Tell à l'Atlas saharien.
ssp. **major** (Rouy) M. et W.

— Gaines densément villeuses — Sahara central.
ssp. **poaeoides** (P.B.) Husnot

— Marge foliaire scabre, serrulée, parfois ± ciliée, mais sans tubercules glanduliformes 5

5 Glumes subégales, de 0,7-0,8 mm env. Panicule à rameaux solitaires ou par 2-3, disposés sur des nœuds glabres. Rachéole se fragmentant en articles. Caryopse jaune brun et luisant, non aplati — Banquettes humides des oueds — Hoggar, SM : dans l'extrême Sud — | *Trop.* | — (= *E. interrupta* Trab. Maire, non (Lamk.) P.B.).

208. — **E. diplachnoides** Steud.

— Glumes nettement inégales (la supérieure deux fois plus longue). 6

6 Panicule à rameaux inférieurs verticillés ou subverticillés, les supérieurs solitaires. Gaines ciliées-barbues autour de la ligule. Rachéole ne se fragmentant pas. Feuilles à marges scabres. Caryopse brun

rouge, non luisant, non aplati — Sables temporairement inondés: banquettes des oueds — RR : La Calle; AR : SC, SM, SO — | *Thermo-cosm.* |.

209. — **E. pilosa** (L.) PB.

— Panicule à rameaux solitaires. Gaines ciliées-barbues autour de la ligule. Rachéole ne se fragmentant pas. Feuilles à marges scabres et même serrulées. Caryopse brun roux, luisant, un peu comprimé latéralement — Champs, pâturages, lits des torrents — R : A1, SS. AC : SC — | *Circumméd.* | — (fig.) — (= *E. vulgaris* Coss. et Germ. var. *microstachya* Coss. et Dur., *E. multiflora* (Forsk.) Asch. var. *poaeoides* Trab.).

210. — **E. Barrelieri** Daveau