XIII. POACEAE - ERAGROSTIDEAE

1 Inflorescence en panicule, épillets pédicellés ..... **1. Eragrostis**
1* Inflorescence en racèmes, épillets sessiles
2 Epis unilatéraux, (épillets tous disposés du même côté de l'axe)
3 Epis digités, au moins les terminaux
4 Epis terminés par une pointe, épis courts ..... **3. Dactyloctenium**
4* Epis terminés par un épillet
5 Glumes aristées..... **4. Acrachne**
5* Glumes sans arête ..... **2. Eleusine**
3* Epis le long d'un axe
9 Lemme ciliée sur les bords, émarginée et aristée dans le sinus ..... **8. Leptochloa** (Trichoneura)
9* Lemme non ciliée
10 Lemme aristée, glumes à peine plus longues que les lemmes ..... **4. Acrachne**
10* Lemme non aristée
11 Glumes plus courtes que les lemmes
12 Inflorescence à plus de 20 racèmes ..... **7. Desmostachya**
12* Inflorescence à moins de 10 racèmes ..... **5. Coelachyrum**
11* Glumes 2 fois plus longues que les lemmes, inflorescence à moins de 15 racèmes ..... **6. Dinebra**
2* Epis non unilatéraux
13 Epi solitaire..... **10. Tripogon**
13* Plusieurs épis par inflorescence
14 Epillet de 2 à 3mm..... **8. Leptochloa**
14* Epillet de 5 à 9mm ..... **9. Diplachne**

1. Eragrostis Wolf

1 Paléole bordée de longs cils dépassant largement la lemme
2 Panicule spiciforme ..... 1. ***E. ciliaris***
2* Panicule pyramidale ..... 2. ***E. tenella***
1* Paléole non ciliée, ou cils cachés par la lemme
3 Epillet ovale, 1 à 2 fois plus long que large, de 3 à 4mm de large, paléole finement ciliée
4 Epillet de 8mm de large, plante introduite ..... 6. ***E. superba***
4* Epillet de 3 à 4mm de large
5 Glumes pubescentes ..... 5. ***E. turgida***
5* Glumes glabres ..... 7. ***E. cilianensis***
3* Epillet lancéolé à linéaire, plus de 2 fois plus long que large, ou de moins de 2,5mm de large
6 Epillet se désarticulant à partir du sommet et ayant environ 1mm de large, touffe de poils au niveau de la ligule, plante annuelle
7 Lemme de plus de 1mm, panicule large pyramidale, la base souvent enfermée dans la dernière feuille ..... 3. ***E. aspera***
7* Lemme de moins de 1mm, panicule longue et de forme lancéolée ..... 4. ***E. japonica***
6* Epillet se désarticulant à partir de la base
8 Epillet de 1,5 à 3,5mm de large
9 De 2 à 5 fleurs stériles à lemmes plus courtes à la base de l'épillet ..... 8. ***E. egregia***
9* Pas de fleurs stériles à la base de l'épillet
10 Paléole persistante, restant sur l'axe après la chute du caryopse et de la lemme
11 Plante vivace en touffe dense, lemmes aiguës, épillet de 10 à 25mm de long ..... 9. ***E. squamata***
11* Plante annuelle, parfois en touffe dense
12 Epillet de 3mm de large
13 Lemme (pliée) 5 fois plus longues que large, acuminée, souvent à bandes rouges, épillet à plus de 25 paires de lemmes ..... 10. ***E. lingulata***
13* Lemme 3 fois plus longues que large, aiguë, épillet à moins de 20 paires de lemmes.. ..... 7. ***E. cilianensis***


12* Epillet de 1,5 à 2,5mm de large
14 Lemmes de droite et de gauche se recouvrant à la base, lemme pliée 2 à 3 fois plus longue que large
15 Lemme aiguë au sommet, faisant entre-elles un angle de 20° à 30° ..... 11. ***E. minor***
15* Lemme obtuse au sommet, faisant entre-elles un angle de 60° à 90° ..... 12. ***E. tremula***
14* Lemmes ne se recouvrant pas, aiguës au sommet, lemme pliée 4 fois plus longue que large ..... 13. ***E. elegantissima***
10* Paléole caduque, tombant avec le caryopse et la lemme
16 Lemme de 1,5 à 2mm, couvrant complètement l'axe de l'épillet ..... 14. ***E. atrovirens***
16* Lemme de plus de 2mm, axe de l'épillet visible entre les lemmes à maturité ..... 15. ***E. barteri***
8* Epillet de 0,5 à 1,5mm de large ... (->17)
17 Epillet de 1 à 1,5mm de large
18 Paléole persistante, restant sur l'axe après la chute du caryopse et de la lemme
19 Panicule linéaire ou pyramidale étroite, lemmes faisant entre-elles un angle de 15 à 30°
20 Lemme obtuse, tige de 2 à 5mm, plante de plus de 50cm ..... 16. ***E. prolifera***
20* Lemme aiguë, tige de 1 à 1,5mm..... 17. ***E. aegyptiaca***
19* Panicule diffuse
21 Lemmes faisant entre-elles un angle de 15 à 45°
22 Gaines à longs poils souples ..... 11. ***E. minor***
22* Gaines glabres
23 Plante vivace densément cespiteuse, tige de 2 à 3mm de diamètre à la base, lemme pliée 5 fois plus longues que large ..... 19. ***E. curvula***
23* Plante annuelle, tiges de 1mm de diamètre à la base, lemme pliée 3 fois plus longues que large ..... 18. ***E. barrelieri***
21* Lemmes faisant entre-elles un angle de 60 à 90° ..... 12. ***E. tremula***
18* Paléole caduque, tombant avec le caryopse et la lemme
24 Plante annuelle ..... 20. ***E. gangetica***
24* Plante vivace en touffe dense ..... 21. ***E. dumasiana***
17* Epillet de moins de 1mm de large
25 Glume supérieure aussi longue que les lemmes, paléole persistante ..... 7. ***E. aegyptiaca***
25* Glumes bien plus courtes que les lemmes, paléole caduque ..... 22. ***E. pilosa***

1. *Eragrostis ciliaris* (L.) R. Br.

Plante herbacée annuelle de 15 à 60cm, à feuilles de 5 à 10cm et larges de 3mm, gaine striée portant habituellement une touffe de poils au niveau de la ligule; inflorescence en panicule condensée et linéaire, presque spiciforme, de 4 à 12cm de long env. et 5 à 15mm de large, épillets de 2 à 3mm de long et 1,5mm de large, paléole très caractéristique par ses longs cils rayonnants, 2 à 3 fois plus larges que le reste de la lemme et dépassant nettement de l'épillet qui paraît laineux.

Adventice et rudérale sur sable, bords de route sur sable, ripicole, lit des oueds et pelouses de montagne au Sahara. Espèce soudano-sahélienne et saharienne, plante commune. **-M** J&A. Raynal 5097 (Sotuba); Vuillet 458 (Koulouba); **B** Bille 2789 (Dédougou), 3094, 3212 (Sourou); Terrible 5 (Nano); C 5182 (Koro); ••HG 2461; F 1721; I 22; A 1162; AG 540; K 4931.

a. ligule; b. inflorescence; c. détail des glumelles.




2. *Eragrostis tenella* (L.) Roem. & Schult.

Plante herbacée annuelle en petites touffes, de moins de 10 à 25cm; panicule de 10cm de haut et de 3 ou 4cm de large, épillets très petits, lancéolés, de 1 à 1,5mm de large et de 2mm de long, cils des paléoles dépassant les lemmes.

Adventice ou rudérale sur sable, terrains dénudés. **-B** A 5512 (Bobo-Dioulasso); Terrible 8 (Nasso); ••F 1865; A 8690; PdF 3271; C 1949, 62.

a. inflorescence; b. base de l'épillet.




3. *Eragrostis aspera* (Jacq.) Nees

Plante herbacée annuelle de 30 à 90cm; panicule très fournie, à très nombreux épillets, généralement ciliés aux noeuds, la base souvent à moitié enfermée dans la gaine de la dernière feuille, pédicelles de 3 à 12mm en moyenne, épillets de 1 à 1,2mm de large et de 2 à 5mm de long, glumes à carène denticulée, lemme de 1,2 à 1,5mm, dos des lemmes faisant entre-eux un angle de 60° environ; caryopse presque sphérique.

Jachères, rudérale humide, berges de marigots, lits des cours d'eau. Espèce soudano-sahélienne. **-M** Adam 11379 (Bamako); Rogeon 285 (Ségou); **B** Bille 3343 (Bobo-Dioulasso), 3049 (Voum Hou Bagala), 3096 (Sourou); ••A 1517; M 409, 1739; F 937; C 3233, 1830, 1941.

a. ligule; b. inflorescence; c. ramifications d'inflorescence; d. épillet; e. glumelles; f. caryopse.



4. *Eragrostis japonica* (Thunb.) Trin.

Eragrostis namaquensis Nees; *E. diplachnoides* Steud.

Grande plante herbacée annuelle ou pérenne, de 80cm à 1,5m; inflorescence en panicule étroite fusiforme de 40 à 60cm de long et env. 5cm de large, pédicelles courts de 2 à 3mm, épillets de 0,5mm de large, à env. 5 fleurs, lemmes de 0,6 à 0,7mm de long; caryopse ellipsoïdal deux fois plus long que large.

Dépressions et plaines inondables, terrasses alluviales, rizières, jachères, marigots, bord et lit d'oueds au Sahara. Des savanes soudaniennes au Sahara. **-M** Ehya ag Sidiyène 124 (Adrar des Iforas); B 925 (Kéniéroba), 5895 (Niono, Siraouama); A 5104 (Dioumatié); DM 2739 (Kléla), 4226 (San, Benenikenly); **B** T 387 (Kiao), 848 (Dori à Gergedji), 1400 (Tougoumayel), 146 (Kayéro), 768 (Markoye à Tin Akof); Ellenberger 2047 (Tenkodogo), 1928 (Moktedo); ••F 1823, 1210, K 3385; Klein 221; N 108; C 1822.

a. inflorescence; b. épillet; c. caryopse.




5. *Eragrostis turgida* (Schumach.) de Wild.

Plante normalement annuelle, épillets de 3 à 5mm de long et 3 à 4mm de large, épais de 0,8 à 1mm, lemmes un peu coriaces, normalement glabres à quelques cils raides et courts à la base, rarement bordées d'une ligne de poils, paléoles finement ciliées; caryopse lenticulaire, plan-convexe, brun-rouge.

Rudérale, bords des routes, jachères, affleurements rocheux, savanes dégradées, dépressions hydromorphes, lits des cours d'eau. Espèce soudanienne. **-M** Diarra Ng 171 (Sikasso, Sanzana); B 441 (Sotuba),J&A. Raynal 5044 (Sotuba); Rogeon 301 (Koulikoro); **B** C 4781 (Kouinima), 4890 (Kouroumа);**B** Bille 3348 (Bobo-Dioulasso); Duverger & Raynal 6186 (Banzon); ••A 755, 506; AG 1854, 1901, 3006; F 1480; PdF 3201; C 252, 277; M 1108.

a. feuille; b. épillet; c. détail des lemmes; d. paléole; e. caryopse, face et profil.




6. *Eragrostis superba* Peyr.

Plante vivace cespiteuses de 50 à 120cm; inflorescence en panicule de 15 à 30cm de long, et 3 à 10cm de large, épillets ovales de 10mm de long et 8mm de large, lemmes jaunâtres glabres.

Plante introduite en Afrique de l'Ouest, signalée au


Burkina Faso à la station agronomique de Saria, selon Lebrun & al. (1991). **-B** Traoré 146 (Saria); ••B 1199; Mosnier 2176.
a. épillet.



7. *Eragrostis cilianensis* (All.) Janch.

Plante annuelle cespiteuse de 15 à 60cm, feuilles souvent bordées de glandes, mais pas toujours; panicule pyramidale à épillets relativement peu nombreux, blanc-verdâtre pâle, de 2,5 à 3,5mm de large et de 4 à 12mm de long, ovales à oblongs, glume inférieure acuminée, paléole ciliée sur les bords, les cils restant cachés par la lemme, paléoles persistantes après la chute de la lemme.


Steppes, rudérale sur sable, bords et lits des oueds au Sahara, adventice des oasis. Espèce soudano-sahélienne et saharienne. **-M** Rogeon 463 (Ansongo); **B** A.Chev. 24775 (Ouahigouya), 24551 (Fada à Koupéla); ••AG 434, 373, 646; HG 2434; Nabia Koundja 9; N 98; F 1720; Béchir & César 78; C 2460, 2914.
a. feuille et inflorescence; b. glandes du bord des feuilles; c. épillet court; d. épillet long; e. paléole; f. bord cilié de la paléole.



8. *Eragrostis egregia* Clayton

Plante vivace cespiteuse de 50cm à 1,5m; panicule grande et lâche, de 20cm, épillets de 10 à 15mm de long et 2mm de large, glumes aiguës, plus aiguës que chez *E. squamata*, épillet à une ou deux (jusqu' à 5) fleurs stériles à la base, la première lemme réduite et sans paléole, l'épillet se désarticulant au-dessus des fleurs stériles, lemmes fertiles de 2 à 2,5mm.


Savanes souvent sur sable, savanes hydromorphes, jachères sur sable. **-B** T 2413 (Kourignon), 2521(Samorogouan); ••Adam 18931; Marnotte 4526; A 6190; C 301, 929.
a. épillet; b. lemme stérile.



9. *Eragrostis squamata* (Lam.) Steud.

Plante vivace densément cespiteuse de 50 à 80cm; panicule assez diffuse à longs rameaux, épillets verdâtres souvent teintés de pourpre, de 2,5 à 3mm de large et de 10 à 25mm de long, lemmes aiguës à acuminées, paléoles ciliées sur les bords.


Plaines inondables et bords de routes, rudérale. Espèce soudano-guinéenne. **-M** DM 2244 (Sikasso, chutes du Farako), 2243 (San), 2245 (Dogo, lac Débo); **B** A 5520 (Bobo-Dioulasso), 5421 (Banfora); C 5497 (Toussiana); A 1865; F 1943; 1279.
a. épillet; b. lemmes; c. paléole.



10. *Eragrostis lingulata* Clayton

Plante annuelle grêle à tige de 20 à 40cm, feuilles peu nombreuses; inflorescence à pédicelles courts, épillets généralement longs, de 20 à 30mm de long et 3mm de large à 30 à 55 paires de lemmes, lemmes acuminées à tache linéaires carmin à brun-rouge, paléoles persistantes.

Steppes herbeuses, stteppes hydromorphes, sables. **-M** B 5715 (Niono); A 5063 (Kimparana); DM 909; **B** T 1406 (Djibo), 3017 (Barani); Tezenas 31 (Bidi); ••Carrière 125, 336.
a. rameau d'inflorescence; b. détail de l'épillet; c. glume.




11. *Eragrostis minor* Host

Plante annuelle cespiteuses, parfois en touffe dense, de 5 à 45cm, feuilles glabres ou ciliées,

gaine à longs poils souples; panicule pyramidale étroite, à pédicelles courts, épillets de 1,2 à 1,7mm de large et 5 à 12mm de long.

Steppes, rocailles, sols détritiques. ••Barry 605; Mosnier 3340; HG [P01786226].

a. feuilles; b. rameau d'inflorescence; c. base de l'épillet.




12. *Eragrostis tremula* (Lam.) Steud.

Plante annuelle plus ou moins prostrée, ou cespiteuse; inflorescence souvent grêle et diffuse, parfois à touffes de poils aux noeuds, épillets blanc jaunâtre souvent teintées de rose, de 1,4 à 2,2mm de large et de 10 à 20mm de long en général, mais pouvant atteindre 40mm, lemmes obtuses ou presque arrondies au sommet, paléoles finement ciliées sur les bords.

Steppes et savanes dégradées, dunes, jachères, adventice et rudérale sur sable, terrains épuisés. De la zone soudanienne au Sahara, plante commune. **-M** Diarra 657 (Sikasso, Sanzana); Pagot 93A, 154 (Nampala); B 6596 (Doro); **B** Bille 3093 (Sourou), 2881 (Soukoui), 3266 (Illa); Mordant 507 (Nouna-Barani); Terrible 6 (Nano); Botté 10 (Markoye); C 4786 (Kouinima); ••AG 435, 423, 2068, 2407, 1189; A 805; HG 2425; Klein 161; C 1757.

a. ramifications d'inflorescence; b. base de l'épillet; c. lemmes; d. épillet âgé, paléoles persistantes; e. paléole. (232)




13. *Eragrostis elegantissima* Chiov.

Plante herbacée annuelle de 10 à 40cm, peu feuillée; panicule plus ou moins diffuse, épillets de 15 à 20mm de long et de 1,6mm de large, lemme rosée de 2,4mm env., portant souvent une bande latérale marron, lemmes faisant entre-elles un angle très aigu.

Steppes arides, steppes arbustives, steppes tigrées, Sahel et Sahara. **-M** B 7218 (Nantaka); **B** T 2879 (Sambonay), 1408 (Djibo), 1807 (Gorom-Gorom), 1452 (Yalogo), 2474 (Oursi); Grouzis 575 (Oursi); Tézenas 89 (Bidi); Duranton 220 (Saria, Vili); ••HG 1218, 3114; Duranton 3805.

a. épillet; détail des lemmes.




14. *Eragrostis atrovirens* (Desf.) Steud.

Plante herbacée vivace cespiteuse ou plus ou moins stolonifère ou rhizomateuse; épillet large de 2 à 2,5mm, lemmes de 1,5 à 2mm, lemmes de droite et de gauche faisant un angle de 30 à 60°, et recouvrant entièrement l'axe de l'épillets, paléoles à carènes denticulées.

Mares et marécages, bowé, bords de mares, dépressions humides, cours d'eau temporaires, lit de rivières. Région soudanienne. **-M** Derbal 188 (Sotuba); DM 2144 (Sorme); Diarra 80 (Sanzana à Zampresso); B 920 (Kéniéroba); Raynal 20980 (lit de l'Oueyanko); **B** Bille 3335 (Bobo-Dioulasso), 3374 (Warkoye); Bouyer 156 (Karfiguéla), C 4181 (Bobo-Dioulasso, Borodougou), 4923 (Koro, Dahana), 5178 (Koro), 5485 (Toussiana, Dramandougou), 5957 (Farako-Ba); ••M 2010; AG 739, 2946; Klein 215; F 1262; PdF 3581.

a. épillet; b. glumelles.




15. *Eragrostis barteri* C.E. Hubb.

Plante herbacée vivace à souche plus ou moins radicante; épillets de 2,5 à 3mm de large, parfois 4mm quand les lemmes sont écartées, lemmes de 2,2 à 3mm, aiguës, faisant entre-elle un angle de 60 à 90° env. et laissant souvent voir l'axe de l'épillet à leur base.

Ripicole, bords et lit des cours d'eau. **-M** B 6834 (Gourma-Rharous), 5950 (Niono), 7073 (Mopti, Konna); Adam 11187 (Sotuba); J&A. Raynal 5155 (Sotuba); **B** T 2969 (Bassora), 2990 (Samandeni); C & Bouyer 4486 (Banfora, Karfiguéla); ••A 172, 519; M 336; AG 1565, 1927; Klein 272, 236; C 453.

a. base de la plante; b. épillet; c. détail des lemmes.




16. *Eragrostis prolifera* (Sw.) Steud.

Eragrostis domingensis (Pers.) Steud.; *E. linearis* (Schumach.) Benth.

Plante vivace à tige de 80cm à 1,2m, et de 2 à 5mm de diamètre, feuilles glauques de 15 à 25cm de long et 4mm de large, enroulées en gouttière, touffe de poils au niveau de la ligule, racines entourées d'un manchon de poils agglutinant le sable; panicule de 20 à 30cm à ramifications dressées, épillets de 1mm de large et 5 à 12mm de long, paléoles persistantes à la base de l'épillet, lemme souvent à taches brunes.

Sables humides, savanes hydromorphes, sables littoraux. **-M** B 6997 (Gourma-Rharous); A.Chev. 42329 (Bamba à Tombouctou); ••A 2470; Valenza 273.

a. racine; b. ligule; c. épillet; d. épillet âgé.




17. *Eragrostis aegyptiaca* (Willd.) Delile

Petite plante herbacée annuelle en touffes denses, de 15 à 60cm de haut, tige de 1 à 1,5mm de diamètre, feuilles de 3 à 8cm et larges de 1mm; inflorescence en panicule linéaire, épillets de 1mm de large et 10mm de long, blanc-jaunâtre et luisants, lemmes serrées se recouvrant étroitement, paléoles persistantes non ciliées, caryopse oblong.

Steppes, dépressions humides, bords des eaux, oueds au Sahara. **-M** DM 2074 (Sorme), 2247 (Diafarabé); B 6983 (Gourma-Rharous), 7625 (lac Débo), 7609 (lac Tanda); A.Chev. 1224 (Bourem); J&A. Raynal 5463 (Sotuba); ••F 1623; HG 3411, [ALF062122].

a. base de l'épillet; b. paléoles persistantes sur le rachis; c. caryopse.




18. *Eragrostis barrelieri* Daveau

Plante herbacée annuelle de 15 à 40cm, à feuilles de 3 à 6cm; panicule de 5 à 15cm de long et 3 à 6cm de large, épillets de 10 à 20mm de long et 1,2mm de large, glume inférieure de 1,2mm, glume supérieure de 1,6mm, lemmes de 2mm, paléaoles ciliolées.

Oueds et steppes humides du Sahara, massifs du Sahara. ••Adam 13227; Germaux & PdF 4591; HG 1607, 653; Dulieu 1315.

a. épillet; b. détail des glumelles.




19. *Eragrostis curvula* (Schrad.) Nees

Plante vivace cespiteuse de 80cm, gaines à nervures proéminentes, feuilles enroulées sur les bords, gaines basales à longs poils soyeux caduques, racines entourées d'un manchon agglutinant le sable; panicule de 15 à 20cm dense et diffuse, épillets de 1 à 1,2mm de large et env. 5mm de long, lemmes caduques à partir de la base, paléoles persistantes.

Plante d'Afrique du Sud, introduite ailleurs; probablement introduite au Mali. ••Drège 8126 [P00346335].

a. épillet; b. glumes.




20. *Eragrostis gangetica* (Roxb.) Steud.

Eragrostis cambessediana Steud

Plante herbacée de 30 à 60cm, assez grêle, à feuilles étroitement linéaires, parfois presque filiformes, de 0,5 à 2mm de large; épillets verdâtres de 1,2 à 1,5mm de large, longs de 3 à 6mm, lemmes de droite et de gauche faisant un angle de 90° env., paléoles à carènes denticulées, rachis en zigzag; caryopse presque sphérique.

Rudérale et adventice, mares, rizières, bowé, savanes hydromorphes, gueltas. De la zone soudanienne au Sahara. **-M** Adam 11368 (Sotuba); DM 4204 (Koutiala), 3241 (Finnkolo); **B** Bille 2906 (Soukoui), 2786 (Dédougou), 3286 (Djibasso); T 2879 (Sambonay); C 4641 (Koro, Dahana), 4895 (Kourouma), 5129 (Koro, Kou); ••A 832, 935,1709, 901, 1868; AG 2450; F 1048; HG 3632, 3644; C 3860, 59, 735.

a. épillet; b. glumelles; c. caryopse.




21. *Eragrostis dumasiana* A. Chev.

[Pourrait-être un forme de *E. gangetica* ?]

Plante vivace densément cespiteuse, de 15 à 20cm, feuilles de 10cm et de 1mm de large, presque toutes à la base; panicule de 10cm env., épillets de 1,3 à 1,5mm de large, longs de 3 à 6mm, lemmes teintées de pourpre sur le dos, paléoles finement denticulées.

Mares, bowé, rizières. Région soudanienne. **-M** DM 2771 (Kléla), 4313 (Kouniana); Adam 11333 (Sotuba); **B** T 2447 (Soumousso); A.Chev. [P00434879] (Bobo-Dioulasso à Banfora); C 4641 (Koro, Dahana), 4655, 5978 (Koro); ••A 1917.

a. épillet; b. glumelles.



22. *Eragrostis pilosa* (L.) P. Beauv.

Plante annuelle grêle de 30 à 50cm à feuilles de 0,5 à 2mm de large; panicule diffuse à épillets très étroits, longs de 3 à 10mm, à rachis flexueux, glumes courtes, l'inférieure égale au quart de la lemme, la supérieure à la moitié de la lemme, lemmes à dos presque parallèles; caryopse ellipsoïdal.

Dépressions humides, bords de mares, rudérale, adventice, jachères, bords et lits des oueds au Sahara. De la zone soudanienne au Sahara. **-M** B 6533 (Gao), 6782 (Gourma-Rharous), 6587 (Gao, Doro); Ehya ag Sidiyène 125 (Adrar des Iforas); DM 2009 (Dogo, lac Débo); **B** C 5789, 5793 (Djibo); ••AG 914, 403, 405, 364, 195, 948, 462; HG 2255, I 11; C 43.

a. épillet; b. caryopse.

