1011. Eragrostis N. M. Wolf [*]

Pl. ann. ou pérennes. Ligule courte ou réduite à des poils. Panicule diffuse, plus rarement contractée. Epillets pédicellés, comprimés latéralement, pluriflores, à fl. densément imbriquées. Rachéole se désarticulant au-dessus des glumes et entre les fl., ou bien persistante avec les lemmes. Glumes ± inégales, aiguës, membraneuses, 1-3-nerviées, plus courtes que la lemme inf. Lemme papyracée, aiguë, carénée ou arrondie sur le dos, 3-nerviée, mutique ou un peu mucronée. Paléole subégale, à 2 carènes parfois ciliées. Lodicules 2, glabres. Etam. 3. Ovaire glabre ; styles 2, apicaux, plumeux seulement au sommet. Caryopse subglobuleux à oblong, non sillonné, macule hilaire ponctiforme.

1 - F. à marges portant des poils glanduleux. Glume sup. 3-nerviée.

4102. E. cilianensis (All.) Janch.
≡ *Poa cilianensis* All.
≡ *Eragrostis megastachya* f. *cilianensis* (All.) Asch. & Graebn.
≡ *E. multiflora* var. *cilianensis* (All.) Maire
= *E. cilianensis* subsp. *major* (Rouy) Maire & Weiller

- subsp. **cilianensis**

("Lahmira", "Tinesremt", "Bouhalba"). Th - *P E (A)* - Ermes, pâturages, cultures irriguées ; plaines, basses et moy. montagnes - *S A SAd SH* - Ms (Assa et ailleurs ?) HA MA Mam Man LM (Tizi Nrar, entre Talameghaït et Baïnti) R occidental.

1'- F. à marges ± scabres, sans poils glanduleux. Glume sup. 1-nerviée 2

2 - Pl. vivace, en touffes ; innovations présentes 3

2'- Pl. ann., hampes grêles, généralement nombreuses ; innovations absentes 5

3 - Glume inf. longue c. 1 mm ; la sup. c. 1,5 mm. Lemme longue c. 1, 5 mm.

4103. E. papposa (Dufour) Steud.
≡ *Poa papposa* Dufour
= *Eragrostis vulgaris* var. *speirostachya* Coss. & Dur.

Paléoles persistantes sur la rachéole. Anthères longues c. 0,25 mm. Hém (G) - *P (E)* - Rocailles et rochers ; plaines, basses et moy. montagnes - *A SAd* - AA occidental (j. Fogo) HA (Amezmiz) Mam (j. Hadid près de Bir Boukefa ; Souss) Man (Sidi Yahya Rharb) Op (régions de Missour et Outat El-Haj).

[*] Par M. Ibn Tattou

3'- Glume inf. longue 1-2 mm ; la sup. 1,5-2 mm. Lemme longue 1,8-3,5 mm 4

4 - Lemme longue 2,2-3,5 mm. Glume inf. longue c. 2 mm, la sup. c. 2,5 mm.

●A **4104. E. atrovirens** (Desf.) Steud.
≡ *Poa atrovirens* Desf.
= *Eragrostis atroviridis* Maire
= *E. a.* var. *hesperidum* Emb. & Maire

Glumes un peu inégales, plus courtes que la lemme adjacente, lancéolées, aiguës, 1-nerviées, membraneuses-papyracées, glabres, scabres sur la carène. Lemme ovale, un peu aiguë, 3-nerviée, nervures latérales ± saillantes, carène un peu scabre. Paléole un peu < lemme, bifide, à 2 carènes scabres. Lodicules cunéiformes, tronquées, c. 0,4 mm. Anthères linéaires, jaunes, 0,4-1 mm. Caryopse oblong, c. 0,6-0,3 mm. Hém (G) - *P E (A)* - Lieux sablonneux humides - *SAd SH* - Man R (koudiat El-Harcha de Tétouan).

4'- Lemme longue 1,8-2,6 mm. Glume inf. longue 1-1,8 mm, la sup. 1,5-2,2 mm.

4105. E. curvula (Schrad.) Nees
≡ *Poa curvula* Schrad.

Glumes carénées, 1-nerviées, aiguës, l'inf. lancéolée, la sup. ovale. Fl. fertiles apprimées sur la rachéole. Lemme elliptique ou ovale, membraneuse, grise, carénée, 3-nerviée, obtuse ou aiguë. Paléole à carènes lisses ou scabriuscules. Anthères c. 1 mm de long. Caryopse adhérent, ellipsoïde, long 0,7 mm. Hém - *SAd* - Man (W Maâmora, env. de Dir El-Amer). Naturalisé ?

5 - (2') Glumes caduques. Anthères longues c. 0,2 mm. Caryopse orbiculaire, 5 mm de diam. Lemme longue 1,2-1,7 mm.

4106. E. aspera (Jacq.) Nees
≡ *Poa aspera* Jacq.

"Lhmira". Th - *S* - Ms (Sahara)? ; à confirmer.

5' - Glumes persistantes. Anthères longues 0,3-3 mm. Caryopse oblong, 0,6-1,7 x 0,3-0,4 mm. Lemme longue 1,8-2 mm. 6

6 - Axe de la panicule glabre et lisse ; rameaux solitaires, svt rameux dès la base, lisses à la base ; pédicelles latéraux plus courts que les épillets.

4107. E. barrelieri Daveau
= *E. barrelieri* var. *ambigua* Dobignard & Portal

Epillets 8-15 x 1,5-2 mm. Glumes ± aiguës, l'inf. c. 1 mm, la sup. c. 2 mm. Lemmes c. 2 mm, obtuses. Lodicules cunéiformes, tronquées, c. 0,25 mm. Anthères c. 3 mm. Caryopse luisant, translucide, 1,5-1,7 x 0,4 mm. Th - *P (E)* - Lieux sablonneux ou pierreux ; plaines et basses montagnes - *S A* - Ms occidental Mam Op (piste Tissaf à Bouloutane ; env. de Missour) Man (Sidi Yahya Gharb).

6' - Axe de la panicule longuement cilié-barbu aux nœuds inf., ailleurs glabre, strié, lisse ; rameaux inf. verticillés, les sup. solitaires ; pédicelles égalant les épillets, un peu plus courts ou un peu plus longs.

4108. E. pilosa (L.) P. Beauv.
≡ *Poa pilosa* L.
= *E. pilosa* f. *atroviolacea* Maire & Weiller

- subsp. **pilosa**

Epillets pouvant atteindre 5 x 1 mm, 6-10-flores. Glumes uninerviées, aiguës, glabres, lisses, l'inf. c. 0,5 mm, la sup. c. 1,2 mm. Lemme c. 1,8 mm. Paléole c. 1,2 mm, à 2 carènes, scabres, persistant assez longtemps sur la rachéole. Lodicules rétuses, c. 0,15 mm. Anthères c. 0,3 mm. Caryopse un peu rugueux, non luisant, c. 0,6 x 0,3 mm. Th - *P (E)* - Pâturages sablonneux ou pierreux ; plaines - *S A SAd* - Ms (Assa) Man (Fès, ravin de Dhar Mehraz).

---

* Par M. Ibn Tattou
* Par M. Fennane