Lasiurus scindicus Henrard



Hviv

Synonymes : *Lasiurus hirsutus* (Forssk.) Boiss. (1859)
Rottboellia hirsuta (Forssk.) Vahl (1790)
Saccharum hirsutum Forssk. (1775)

Lasiurus scindicus appartient à la tribu des Andropogoneae.

Description : espèce pérenne atteignant 90 centimètres de haut, formant de grosses touffes d'autant plus denses et compactes qu'elles sont plus pâturées et mutilées, de couleur vert foncé plus ou moins glauque. **Inflorescence** spiciforme (10 à 15 centimètres de long et 5-6 millimètres de diamètre), de couleur blanc argenté, soyeuse en raison d'une importante villosité. Se désarticule en séchant.

Biogéographie : espèce saharo-sindienne.

Type biomorphologique de Raunkier : chamaephyte.

Port : herbe vivace cespiteuse.

Préférences édaphiques : espèce des sols sablo-limoneux.

Préférences hydriques : espèce eury-xérophile.

Tolérance aux sels : non.

Biotopes : espèce présente dans certains oueds, bas de pente et épandages, sur sols susceptibles de capter de bonnes réserves hydriques. C'est plus une espèce de lisière que de vastes peuplements extensifs.

Intérêt pour le Criquet pèlerin : Plante utile. Peut offrir abri et nourriture dans divers biotopes de reproduction du Sahara méridional et central.

Espèce voisine : hors période de reproduction, elle peut être confondue avec ***Panicum turgidum*** Forssk. par des observateurs peu avertis.

Références bibliographiques

Ozenda	152	Quézel & Santa	83	Barry & Celles	408	Nègre	



Belle touffe en floraison-fructification, en bordure de ravine.



Inflorescence spiciforme soyeuse.



Inflorescence en début de dessèchement.

