

FIG. 255.
Oryzopsis miliacea.

196. **O. miliacea** (L.) Asch. et Schw., Illustr. Fl. Egypte, p. 169 (1887) ; B. et T., Fl. Alg. Mon., p. 166, et Fl. Syn., p. 366 ; Pamp., Pl. Trip., p. 30, et Fl. Ciren., p. 101 ; M., C. 748, 2602 ; J. et M., Cat. Maroc, p. 35, 927 ; Maire, Sahara central, p. 63. — *Agrostis miliacea* L., Sp., p. 61 (1753). — *Piptatherum miliaceum* (L.) Coss., Pl. Crit., p. 129 (1851) ; Coss. et Dur., Expl. Sc. Alg., p. 73 ; B. et B., Cat. Tun., p. 460. — *P. multiflorum* (Cav.) P. B., Agrost., p. 173 (1812). — *Milium multiflorum* Cav., Descr. Pl., p. 36 (1802). — ♃. Rhizome court et épais, émettant de nombreux chaumes serrés à leur base, dressés ou genouillés-ascendants, ± frutescents et portant souvent des rameaux fasciculés à leurs nœuds, atteignant 1,5 m, glabres, ± scabres. Gaines < entrenœuds, arrondies sur le dos, striées, non scabres, glabres, à marges hyalines, non auriculées ; ligule courte (< 2 mm), tronquée, très finement pubescente sur le dos ; limbe linéaire, plan puis s'enroulant, atteignant 30 cm × 10 mm, glabre, strié, lisse extérieurement, sillonné et scabre, pubescent vers la base intérieurement, aigu à pointe molle. Panicule atteingant 40 cm, très rameuse, lâche, diffuse, multiflore, un peu penchée au sommet ; axe lisse et glabre ; rameaux fasciculés, inégaux, longs, grêles, scabres, très rameux, à ramules ordinairement géminés ; épillets petits, ovoïdes, à pédoncules ordinairement plus longs qu'eux, souvent violacés. Glumes ovales-

lancéolées, acuminées, 3-nerviées, glabres et lisses, peu inégales, l'inférieure c. 3,5 mm, la supérieure c. 3,25 mm. Lemme glabre, obtuse, 3-nerviée, peu indurée, c. 2,3 mm, à callus glabre presque nul, obtus, à arête terminale de 3-5 mm, caduque, scabre. Paléole involutée, peu indurée, subaiguë, glabre. Lodicules 2, c. 0,5 mm, linéaires. Anthères 3, jaunes, barbues au sommet, c. 1,5 mm. Caryopse oblong-fusiforme, brun roux, c. 1,5 × 0,6 mm, chagriné, à macule hilaire linéaire atteignant à peu près son milieu, à embryon court (0,5 mm). Floraison : avril-décembre.

A. Panicule multiflore, grande, très rameuse.

B. Epillets des rameaux inférieurs de la panicule bien développés ; ces rameaux fasciculés par 4-8 :

f. **typica** (Fiori) Maire et Weiller, com. nov. — *Milium multiflorum* var. *typicum* Fiori, Fl. Anal. Ital., p. 87.

BB. Rameaux inférieurs de la panicule en fascicules denses de 20-50, ne portant que des épillets avortés ou quelques rares épillets fertiles :

f. **Thomasii** (D. C. et Duby) Asch. et Gr., Syn. 2, p. 97 (1898). — *Milium Thomasii* D. C. et Duby, Bot. Gall. 1, p. 505 (1828).

AA. Panicule pauciflore plus petite, peu rameuse :

f. **pauciflora** (Bég. et Vacc.) Maire et Weiller, comb. nov. — *O. pauciflora* Bég. et Vacc., Ann. di Bot. 12, p. 94 (1912).

Forêts claires, broussailles, rocailles des plaines littorales et des montagnes, jusque vers 2000 m ; manque dans le Sahara, sauf dans les hautes montagnes. — Cyr. Commun dans la Montagne Verte ! et sur le littoral de la Marmarique ! jusqu'à Bardia. — Tr. Assez commun dans les montagnes de Homs à Nalout !, plus rare sur le littoral — T Commun jusqu'au Sahara ! — Alg. Commun du littoral au Sahara ! — M. Commun jusqu'au Sahara ! — Sahara central : Hoggar, lieux humides et rochers de l'Atakor, de 2.000 à 2.600 m (M.).

La forme *Thomasii* çà et là, rare : C. Bougie (M.). A. Gorges de la Chiffa ! (Ducellier). — M. Ksiba ! (M.). — La forme *pauciflora* : Tr. Oasis de Tripoli à Charachat (Vaccari).

Aire géographique. — Région méditerranéenne et irano-touranienne.