240. **S. virginicus** (L.) Kunth, Rev. Gram. 1, p. 57 (1829); J. et M., Cat. Maroc, p. 928. — *S. arenarius* (Gouan) Duval-Jouve, Bull, Soc. Bot. France, 16, p. 294 (1869) ; J. et M., Cat. Maroc, p. 38 ; Pamp., Fl. Ciren. p. 102. — *S. pungens* (Schreb., Beschr. Gräs. 2, p. 46, anno 1779, sub *Agrostide*) Kunth, Rev. Gram. 1, p. 68 (1829) ; Coss. et Dur., Expl. Sc. Alg. p. 62 ; B. et T., Fl. Alg. Mon. p. 151, et Fl. Syn. p. 362 ; B. et B., Cat. Tun. p. 451 ; Pamp., Pl. Trip. p. 37. — *Agrostis arenaria* Gouan, Illustr. p. 3 (1773). — *A. virginica* L., Sp. p. 63 (1753). — ♃. Rhizome longuement rampant, blanchâtre, squameux, ± radicant aux nœuds, émettant çà et là des surcules densément squameux et des tiges feuillées stériles et fertiles dressées. Chaumes glabres, lisses, non ou à peine striés, à peu près complètement vêtus de gaines depuis la surface du sol jusqu'à l'inflorescence, ordinairement ± cespiteux, 10-30 cm, à entrenœuds parfois très courts de sorte que deux feuilles paraissent opposées. Feuilles vertes densément distiques ; gaines arrondies sur le dos, striées-côtelées, apprimées, glabres et lisses, à oreillettes longuement ciliées ; ligule très courte, finement laciniée, simulant une rangée de poils courts ; limbe 2-8 cm × 2-5 mm, courbé longitudinalement en gouttière, s'enroulant ± par la dessiccation, raide, atténué au sommet en pointe piquante, sillonné et ± longuement velu sur la face supérieure, strié, glabre et lisse sur la face inférieure, scabre sur les marges. Panicule linéaire-lancéolée, ovoïde-lancéolée ou ovoïde, aiguë, incluse à sa base dans les gaines supérieures ou brièvement exserte, dense, raide ; axe lisse, glabre ; rameaux solitaires, dressés



FIG. 300. *Sporobolus virginicus.*

épais, glabres et lisses, ± longuement nus, très rameux, portant des épillets densément agglomérés ; pédoncules < épillet, un peu scabres. Glumes lancéolées, aiguës, papyracées, glabres et lisses ou légèrement scabres sur la carène ; l'inférieure 2-2,6 mm, sans nervure visible ou 1-nerviée ; la supérieure c. 3 mm, uninerviée. Lemme presque aussi longue que la glume supérieure, membraneuse, hyaline, lancéolée, aiguë, glabre, lisse, 1-nerviée. Paléole égalant la lemme, 2-nerviée, lancéolée, aiguë, glabre et lisse. Lodicules 2, larges et courtes, ± flabelliformes, arrondies, souvent ± crénelées au sommet, c. 0,5 mm. Anthères 3, jaunes ou violacées, 1-1,5 mm. Fruit libre, oblong, à péricarpe membraneux hyalin séparable ; graine à macule hilaire ponctiforme basale (d'après Cosson). — Floraison : juillet-octobre.

Plante représentée dans notre Flore par :

var. ***arenarius*** (Gouan) Maire in J. et M., Cat. Maroc, p. 928 (1941). — *Agrostis arenaria* Gouan, sensu stricto. — Diffère du type (var. *eu-virginicus* Maire, n. nom.) par la panicule non ou à peine exserte, plus large, ovoïde et non linéaire-lancéolée ; par les glumes nettement inégales, l'inférieure c. 2 mm, la supérieure 3 mm (et non presque égales).

Sables maritimes. — Cyr. Fréquent de Bengasi à Tobrouk. — Tr. Tripoli ; Macabets. — T. Assez commun sur le littoral de Tabarka à Gabès. — Alg. Commun sur le littoral. — M. Commun sur le littoral méditerranéen et atlantique jusqu'à Agadir.

Aire géographique. — Var. *eu-virginicus* : côtes des régions paléo- et néo-tropicales ; côte atlantique de l'Amérique du Nord jusqu'à la Virginie. Var. *arenarius* : côtes méditerranéennes ; côte atlantique de la péninsule ibérique. Iles du Cap Vert.